







Chraňte sebe i svoji rodinu

Vybrané možnosti očkování v rámci **povinného a doporučeného** očkovacího kalendáře **pro děti do 1 roku.**



	POVINNÁ OČKOVÁNÍ	DOPORUČENÁ HRAZENÁ OČKOVÁNÍ	DOPORUČENÁ NEHRAZENÁ OČKOVÁNÍ
6 TÝDNŮ			<p>Rotarix</p> <p>Rotaviry 1. dávka vakcíny Rotarix podávaná ústy od 6 týdnů věku</p>
9. TÝDEN	<p> HEXAVAKCÍNA 1. dávka*</p>	<p> BEXSERO</p> <p>Meningokok B 1. dávka vakcíny Bexsero plně hrazená ZP*</p>	
3 MĚSÍCE		<p>Očkování proti pneumokokovým infekcím u zdravých dětí (dětí bez rizikových faktorů) s podáním první dávky ve 2 měsících věku. Očkovací schéma dle vybrané vakcíny.*</p>	<p>Rotarix</p> <p>Rotaviry 2. dávka vakcíny Rotarix podávaná ústy, do 24. týdnů věku. Min. odstup mezi dávkami jsou 4 týdny</p>
4 MĚSÍCE	<p> HEXAVAKCÍNA 2. dávka*</p>	<p> BEXSERO</p> <p>Meningokok B 2. dávka vakcíny Bexsero plně hrazená ZP*</p>	
11.-13. MĚSÍC	<p> HEXAVAKCÍNA Přeočkování*</p>		
12-15 MĚSÍCŮ		<p> BEXSERO</p> <p>Meningokok B Přeočkování vakcínou Bexsero plně hrazeno ZP*</p>	

*Vakcína Bexsero je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do konce 12. měsíce věku dítěte nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v zákoně, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

*Očkování proti pneumokokovým infekcím je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v uvedeném ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

* Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3 + 1.

Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa a Rotarix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny Bexsero a Infanrix hexa se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Vakcína Rotarix se podává ústy. O očkování se poraďte s lékařem vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.